

# FOLFOX±Bev

大腸癌

(1クール2週間)

2017/5/1改訂

前投薬30分	生食 100mL デキサート (3.3mg/mL/A) 2 A アロキシ静注(0.75mg/5mL/V) 1 V
初回90分 2回目60分 3回目以降30分	生食 100mL アバスチン 5mg/kg
同時に2時間	5%Tz 250mL エルプラット 85mg/m <sup>2</sup> 5%Tz 250mL アイソボリン 200mg/m <sup>2</sup>
15分	生食 50mL 5-FU 400mg/m <sup>2</sup>
インフューザーポンプ 46~48時間	生食 5-FU 2400mg/m <sup>2</sup>

## 減量パターン①

	エルプラット	5-FU	5-FU
1段階	65	300	2000
2段階	50	200	1600

アバスチンは基本的には減量なし  
末梢神経障害のみの場合はエルプラットのみ減量でも可

# FOLFOX±Pmab

(1クール2週間)

大腸癌

2016/5/1改訂

前投薬30分	生食 100mL デキサート (3.3mg/mL/A) 2 A アロキシ静注(0.75mg/5mL/V) 1 V
60分以上かけて	生食 100mL ベクティビックス 6mg/kg
同時に2時間	5%Tz 250mL エルプラット 85mg/m <sup>2</sup>
	5%Tz 250mL アイソボリン 200mg/m <sup>2</sup>
15分	生食 50mL 5-FU 400mg/m <sup>2</sup>
インフューザーポンプ 46~48時間	生食 5-FU 2400mg/m <sup>2</sup>

## 減量パターン①

	エルプラット	5-FU	5-FU
1段階	65	300	2000
2段階	50	200	1600

## ベクティビックス

1段階	4.8
2段階	3.6

末梢神経障害のみの場合はエルプラットのみ減量でも可

# FOLFIRI±Bev

(1クール2週間)

大腸癌

2017/5/1改訂

前投薬30分	生食 100mL デキサート (3.3mg/mL/A) 2 A アロキシ静注(0.75mg/5mL/V) 1 V
初回90分 2回目60分 3回目以降30分	生食 100mL アバスチン 5mg/kg
同時に2時間	5%Tz 250mL CPT-11 150mg/m <sup>2</sup> 5%Tz 250mL アイソボリン 200mg/m <sup>2</sup>
15分	生食 50mL 5-FU 400mg/m <sup>2</sup>
インフューザーポンプ 46~48時間	生食 5-FU 2400mg/m <sup>2</sup>

## 減量パターン①

	CPT-11	5-FU	5-FU
1段階	120	0	2000
2段階	100	0	1600

アバスチンは基本的には減量なし  
下痢のみの場合はCPT-11のみ減量でも可

# FOLFIRI+Ram

(1クール2週間)

大腸癌

2017/5/1改訂

前投薬30分	生食 100mL デキサート (3.3mg/mL/A) 2 A アロキシ静注(0.75mg/5mL/V) 1 V ポララミン(5mg/ml/A) 1 A
60分かけて	生食 250mL サイラムザ 8mg/kg
同時に2時間	5%Tz 250mL CPT-11 150mg/m <sup>2</sup> 5%Tz 250mL アイソボリン 200mg/m <sup>2</sup>
15分	生食 50mL 5-FU 400mg/m <sup>2</sup>
インフューザーポンプ 46~48時間	生食 5-FU 2400mg/m <sup>2</sup>

※サイラムザの生食は全量250mlになるように調整

## 減量パターン①

	CPT-11	5-FU	5-FU
1段階	120	300	2000
2段階	100	200	1600

## たんぱく尿

1段階	6
2段階	5

下痢のみの場合はCPT-11のみ減量でも可

# FOLFOXIRI±BV

大腸癌

(1クール2週間)

2019/4/1 改訂

初回90分 2回目60分 3回目以降30分	生食 100mL アバスチン 5mg/kg
前投薬30分	生食 100mL デキサート (3.3mg/mL/A) 2 A プロイメンド(150mg/V) 1 V アロキシ静注(0.75mg/5mL/V) 1 V
90分	5%Tz 250mL CPT-11 150mg/m <sup>2</sup>
同時に120分	生食 100mL エルプラット 85mg/m <sup>2</sup>
	5%Tz 250mL アイソボリン 200mg/m <sup>2</sup>
インフューザーポンプ 46時間	生食 5-FU 2400mg/m <sup>2</sup>

## 減量パターン①

	L-OHP	CPT-11	5-FU
Level 0	85	-	2400
Level -1	65	150	1800
Level -2	50	120	1200

すべての薬剤を1 Level減少しないように。  
減量基準(別紙)を参考に該当薬剤を減量。

# XELOX±Bev

(1クール3週間)

大腸癌

2016/5/1改訂

前投薬30分	生食 100mL デキサート (3.3mg/mL/A) 2 A アロキシ静注(0.75mg/5mL/V) 1 V
初回90分 2回目60分 3回目以降30分	生食 100mL アバスチン 7.5mg/kg
2時間	5%Tz 500mL エルプラット 130mg/m <sup>2</sup>

day1 夕よりCap 2000mg/m<sup>2</sup>/day/分2を開

## 減量パターン

	エルプラット	Cap
1段階	100	1500
2段階	85	1000

アバスチンは基本的には減量なし  
末梢神経障害のみの場合はエルプラットのみ減量でも可

# XELOX±Pmab 大腸癌

(1クール3週間)

2016/5/1改訂

前投薬30分	生食 100mL デキサート (3.3mg/mL/A) 2 A アロキシ静注(0.75mg/5mL/V) 1 V
60分以上かけて	生食 100mL ベクティビックス 6mg/kg
2時間	5%Tz 500mL エルプラット 130mg/m <sup>2</sup>

day1 夕よりCap 2000mg/m<sup>2</sup>/day/分2を開

## 減量パターン

	エルプラット	Cap
1段階	100	1500
2段階	85	1000
ベクティビックス		
1段階	4.8	
2段階	3.6	

# SOX±Bev

(1クール3週間)

大腸癌

2017/5/1改訂

前投薬30分	生食 100mL デキサート (3.3mg/mL/A) 2 A アロキシ静注 (0.75mg/5mL/V) 1 V
初回90分 2回目60分 3回目以降30分	生食 100mL アバスチン 7.5mg/kg
2時間	5%Tz 500mL エルプラット 130mg/m <sup>2</sup>

## 減量パターン

		day1夕よりday15朝までS-1内服
	エルプラット	体表面積 S-1
1段階	100	1.25未満 80mg/day/分2
2段階	75	1.25~1.5未満 100mg/day/分2
		1.5以上 120mg/day/分2

アバスチンは基本的には減量なし  
末梢神経障害のみの場合はエルプラットのみ減量でも可



# wCPT-11

(1クール4週間)

大腸癌 胃癌

2016/5/1改訂

前投薬30分	生食 100mL デキサート (3.3mg/mL/A) 2 A アロキシ静注(0.75mg/5mL/V) 1 V
90分 day1, 8, 15	5%Tz 250mL CPT-11 100mg/m <sup>2</sup>

## 減量パターン

1段階	80mg/m <sup>2</sup>
2段階	60mg/m <sup>2</sup>

# biwCPT-11

(1クール2週間)

大腸癌 胃癌

2016/5/1改訂

前投薬30分	生食 100mL デキサート (3.3mg/mL/A) 2 A アロキシ静注(0.75mg/5mL/V) 1 V
90分 day1, 15	5%Tz 250mL CPT-11 150mg/m <sup>2</sup>

## 減量パターン

1段階	120mg/m <sup>2</sup>
2段階	100mg/m <sup>2</sup>

Pmab  
(1クール2週間)

大腸癌

2016/5/1改訂

前投薬	なし
60分以上かけて	生食 100mL ベクティビックス 6mg/kg

ベクティビックス

1段階 4.8mg/kg

2段階 3.6mg/kg

# CPT-11+Bev

(1クール2週間)

大腸癌

2017/1/25改訂

前投薬30分	生食 100mL デキサート (3.3mg/mL/A) 2 A アロキシ静注(0.75mg/5mL/V) 1 V
初回90分 2回目60分 3回目以降30分	生食 100mL アバスチン 5mg/kg
90分	5%Tz 250mL CPT-11 150mg/m <sup>2</sup>

## 減量パターン①

	CPT-11
1段階	120
2段階	100

IRIS±Bev  
(1クール4週間)

大腸癌

2019/6/1改訂

前投薬30分	生食 100mL デキサート (3.3mg/mL/A) 2 A アロキシ静注(0.75mg/5mL/V) 1 V
初回90分 2回目60分 3回目以降30分 day1,day15	生食 100mL アバスチン 5mg/kg
90分 day1,day15	5%Tz 250mL CPT-11 125mg/m <sup>2</sup>

減量パターン

CPT-11	FIRIS試験	TRICOLORE試験
full	125mg/m <sup>2</sup>	100mg/m <sup>2</sup>
1段階	100mg/m <sup>2</sup>	80mg/m <sup>2</sup>
2段階	75mg/m <sup>2</sup>	60mg/m <sup>2</sup>

TS-1(2投2休)  
day1よりday14までS-1内服

体表面積	S-1
1.25未満	80mg/day/分2
1.25~1.5未満	100mg/day/分2
1.5以上	120mg/day/分2

# IRIS ± Pmab

(1クール4週間)

大腸癌

2017/11/1改訂

前投薬30分	生食 100mL デキサート (3.3mg/mL/A) 2 A アロキシ静注(0.75mg/5mL/V) 1 V
60分以上かけて day1,day15	生食 100mL ベクティビックス 6mg/kg
90分 day1,day15	5%Tz 250mL CPT-11 125mg/m <sup>2</sup>

## 減量パターン

CPT-11	FIRIS試験	TRICOLORE試験	ベクティビックス
Full	125mg/m <sup>2</sup>	100mg/m <sup>2</sup>	6
1段階	100mg/m <sup>2</sup>	80mg/m <sup>2</sup>	4.8
2段階	75mg/m <sup>2</sup>	60mg/m <sup>2</sup>	3.6

## TS-1(2投2休)

day1よりday14までS-1内服

体表面積	S-1
1.25未満	80mg/day/分2
1.25~1.5未満	100mg/day/分2
1.5以上	120mg/day/分2

IRIS±Bev  
(1クール3週間)

大腸癌

2017/10/1改訂

前投薬30分	生食 100mL デキサート (3.3mg/mL/A) 2 A アロキシン静注(0.75mg/5mL/V) 1 V
初回90分 2回目60分 3回目以降30分	生食 100mL アバスチン 7.5mg/kg
90分 day1	5%Tz 250mL CPT-11 150mg/m <sup>2</sup>

減量パターン

CPT-11  
1段階 120mg/m<sup>2</sup>  
2段階 90mg/m<sup>2</sup>

TS-1(2投2休)  
day1よりday14までS-1内服  
体表面積 S-1  
1.25未満 80mg/day/分2  
1.25~1.5未満 100mg/day/分2  
1.5以上 120mg/day/分2

XELODA±Bev 大腸癌  
(1クール3週間)

2017/3/7改訂

初回90分	生食 100mL
2回目60分	アバスチン 7.5mg/kg
3回目以降30分	

day1 夕よりCap 2000mg/m<sup>2</sup>/day/分2を開



UFT/LV±Bev 大腸癌  
(1クール4週間)

2020年3月

Day1,Day15にBev投与

初回90分	生食 100mL
2回目60分	アバスチン 5mg/kg
3回目以降30分	

day1夕よりUFT/LV 分3を開始  
3週内服1週休薬

# Lonsurf±Bev

(1クール2週間)

大腸癌

2019年8月

Day1,Day15にBev投与

初回90分	生食 100mL
2回目60分	アバスチン 5mg/kg
3回目以降30分	

day1夕よりLonsurf 分2を開始  
5日間内服、9日間休薬