

がん腫	レジメン名	リンク
大腸癌	FOLFOX±Bev 療法(1クール2週間)	シート 1
大腸癌	FOLFOX±Pmab 療法(1クール2週間)	シート 2
大腸癌	FOLFIRI±Bev 療法(1クール2週間)	シート 3
大腸癌	FOLFIRI+Ram 療法(1クール2週間)	シート 4
大腸癌	FOLFOXIRI±Bv 療法(1クール2週間)	シート 5
大腸癌	XELOX±Bev 療法(1クール3週間)	シート 6
大腸癌	XELOX±Pmab 療法(1クール3週間)	シート 7
大腸癌	SOX±Bev 療法(1クール3週間)	シート 8
大腸癌	wCPT-11 療法(1クール4週間)	シート 9
大腸癌	biwCPT-11 療法(1クール2週間)	シート 10
大腸癌	Pmab 療法(1クール2週間)	シート 11
大腸癌	CPT-11+Bev 療法(1クール2週間)	シート 12
大腸癌	IRIS±Bev 療法(1クール4週間)	シート 13
大腸癌	IRIS±Pmab 療法(1クール4週間)	シート 14
大腸癌	IRIS±Bev 療法(1クール3週間)	シート 15
大腸癌	XELODA±Bev 療法(1クール3週間)	シート 16
大腸癌	UFT/LV±Bev 療法(1クール4週間)	シート 17
大腸癌	Lonsurf±Bev 療法(1クール2週間)	シート 18

FOLFOX±Bev 大腸癌
(1クール2週間)

2017/5/1改訂

前投薬30分	生食 100mL デキサート (3.3mg/mL/A) 2 A アロキシ静注 (0.75mg/5mL/V) 1 V
初回90分 2回目60分 3回目以降30分	生食 100mL アバステン 5mg/kg
同時に2時間	5%Tz 250mL エルプラット 85mg/m ²
	5%Tz 250mL アイソボリン 200mg/m ²
15分	生食 50mL 5-FU 400mg/m ²
インフューザーポンプ 46~48時間	生食 5-FU 2400mg/m ²

減量パターン①

	エルプラット	5-FU	5-FU
1段階	65	300	2000
2段階	50	200	1600

アバステンは基本的には減量なし
末梢神経障害のみの場合はエルプラットのみ減量でも可

FOLFIRI±Bev 大腸癌
(1クール2週間)

2017/5/1改訂

前投薬30分	生食 100mL デキサート (3.3mg/mL/A) 2 A アロキシ静注 (0.75mg/5mL/V) 1 V
初回90分 2回目60分 3回目以降30分	生食 100mL アバスチン 5mg/kg
同時に2時間	5%Tz 250mL CPT-11 150mg/m ²
	5%Tz 250mL アイソボリン 200mg/m ²
15分	生食 50mL 5-FU 400mg/m ²
インフューザーポンプ 46~48時間	生食 5-FU 2400mg/m ²

減量パターン①

	CPT-11	5-FU	5-FU
1段階	120	300	2000
2段階	100	200	1600

アバスチンは基本的には減量なし
下痢のみの場合はCPT-11のみ減量でも可

FOLFIRI+Ram 大腸癌
(1クール2週間)

2017/5/1改訂

前投薬30分	生食 100mL デキサート (3.3mg/mL/A) 2 A アロキシ静注 (0.75mg/5mL/V) 1 V ポララミン (5mg/ml/A) 1 A
60分かけて	生食 250mL サイラムザ 8mg/kg
同時に2時間	5%Tz 250mL CPT-11 150mg/m ²
	5%Tz 250mL アイソボリン 200mg/m ²
15分	生食 50mL 5-FU 400mg/m ²
インフューザーポンプ 46~48時間	生食 5-FU 2400mg/m ²

※サイラムザの生食は全量250mlになるように調整

減量パターン①

	CPT-11	5-FU	5-FU
1段階	120	300	2000
2段階	100	200	1600

たんぱく尿

1段階	6
2段階	5

下痢のみの場合はCPT-11のみ減量でも可

FOLFOXIRI±BV 大腸癌
(1クール2週間)

2019/4/1 改訂

初回90分 2回目60分 3回目以降30分	生食 100mL アバスチン 5mg/kg
前投薬30分	生食 100mL デキサート (3.3mg/mL/A) 2 A プロイメンド(150mg/V) 1 V アロキシ静注(0.75mg/5mL/V) 1 V
90分	5%Tz 250mL CPT-11 150mg/m ²
同時に120分	生食 100mL エルプラット 85mg/m ²
	5%Tz 250mL アイソボリン 200mg/m ²
インフューザーポンプ 46時間	生食 5-FU 2400mg/m ²

減量パターン①

	L-OHP	CPT-11	5-FU
Level 0	85	-	2400
Level -1	65	150	1800
Level -2	50	120	1200

すべての薬剤を1 Level減少しないように。
減量基準(別紙)を参考に該当薬剤を減量。

XELOX±Bev 大腸癌
(1クール3週間)

2016/5/1改訂

前投薬30分	生食 100mL デキサート (3.3mg/mL/A) 2 A アロキシ静注(0.75mg/5mL/V) 1 V
初回90分 2回目60分 3回目以降30分	生食 100mL アバステン 7.5mg/kg
2時間	5%Tz 500mL エルプラット 130mg/m ²

day1タよりCap 2000mg/m²/day/分2を開

減量パターン

	エルプラット	Cap
1段階	100	1500
2段階	85	1000

アバステンは基本的には減量なし
末梢神経障害のみの場合はエルプラットのみ減量でも可

XELOX±Pmab 大腸癌
(1クール3週間)

2016/5/1改訂

前投薬30分	生食 100mL デキサート (3.3mg/mL/A) 2 A アロキシ静注(0.75mg/5mL/V) 1 V
60分以上かけて	生食 100mL ベクティビックス 6mg/kg
2時間	5%Tz 500mL エルブラット 130mg/m ²

day1タよりCap 2000mg/m²/day/分2を開

減量パターン

	エルブラット	Cap
1段階	100	1500
2段階	85	1000

ベクティビックス

1段階	4.8
2段階	3.6

SOX±Bev
(1クール3週間)

大腸癌

2017/5/1改訂

前投薬30分	生食 100mL デキサート (3.3mg/mL/A) 2 A アロキシ静注(0.75mg/5mL/V) 1 V
初回90分 2回目60分 3回目以降30分	生食 100mL アバスチン 7.5mg/kg
2時間	5%Tz 500mL エルプラット 130mg/m ²

減量パターン	エルプラット	day1夕よりday15朝までS-1内服
1段階	100	体表面積 S-1 1.25未満 80mg/day/分2
2段階	75	1.25~1.5未満 100mg/day/分2 1.5以上 120mg/day/分2

アバスチンは基本的には減量なし
末梢神経障害のみの場合はエルプラットのみ減量でも可

wCPT-11
(1クール4週間)

大腸癌 胃癌

2016/5/1改訂

前投薬30分	生食 100mL デキサート (3.3mg/mL/A) 2 A アロキシ静注(0.75mg/5mL/V) 1 V
90分 day1, 8, 15	5%Tz 250mL CPT-11 100mg/m ²

減量パターン

1段階 80mg/m²
2段階 60mg/m²

biwCPT-11
(1クール2週間)

大腸癌 胃癌

2016/5/1改訂

前投薬30分	生食 100mL デキサート (3.3mg/mL/A) 2 A アロキシ静注(0.75mg/5mL/V) 1 V
90分 day1, 15	5%Tz 250mL CPT-11 150mg/m ²

減量パターン

1段階	120mg/m ²
2段階	100mg/m ²

Pmab
(1クール2週間)

大腸癌

2016/5/1改訂

前投薬	なし
60分以上かけて	生食 100mL ベクティビックス 6mg/kg

ベクティビックス

1段階 4.8mg/kg

2段階 3.6mg/kg

IRIS ± Bev
(1クール4週間)

大腸癌

2019/6/1改訂

前投薬30分	生食 100mL デキサート (3.3mg/mL/A) 2 A アロキシ静注 (0.75mg/5mL/V) 1 V
初回90分 2回目60分 3回目以降30分 day1,day15	生食 100mL アバスチン 5mg/kg
90分 day1,day15	5%Tz 250mL CPT-11 125mg/m ²

減量パターン

CPT-11	FIRIS試験	TRICOLORE試験
full	125mg/m ²	100mg/m ²
1段階	100mg/m ²	80mg/m ²
2段階	75mg/m ²	60mg/m ²

TS-1(2投2休)
day1よりday14までS-1内服
体表面積 S-1
1.25未満 80mg/day/分2
1.25~1.5未満 100mg/day/分2
1.5以上 120mg/day/分2

IRIS ± Pmab
(1クール4週間)

大腸癌

2017/11/1改訂

前投薬30分	生食 100mL デキサート (3.3mg/mL/A) 2 A アロキシ静注 (0.75mg/5mL/V) 1 V
60分以上かけて day1,day15	生食 100mL ベクティビックス 6mg/kg
90分 day1,day15	5%Tz 250mL CPT-11 125mg/m ²

減量パターン

CPT-11	FIRIS試験	TRICOLORE試験	ベクティビックス
Full	125mg/m ²	100mg/m ²	6
1段階	100mg/m ²	80mg/m ²	4.8
2段階	75mg/m ²	60mg/m ²	3.6

TS-1(2投2休)

day1よりday14までS-1内服

体表面積	S-1
1.25未満	80mg/day/分2
1.25~1.5未満	100mg/day/分2
1.5以上	120mg/day/分2

IRIS ± Bev
(1クール3週間)

大腸癌

2017/10/1改訂

前投薬30分	生食 100mL デキサート (3.3mg/mL/A) 2 A アロキシ静注 (0.75mg/5mL/V) 1 V
初回90分 2回目60分 3回目以降30分	生食 100mL アバスチン 7.5mg/kg
90分 day1	5%Tz 250mL CPT-11 150mg/m ²

減量パターン

CPT-11
1段階 120mg/m²
2段階 90mg/m²

TS-1(2投2休)
day1よりday14までS-1内服
体表面積 S-1
1.25未満 80mg/day/分2
1.25~1.5未満 100mg/day/分2
1.5以上 120mg/day/分2

XELODA±Bev 大腸癌
(1クール3週間)

2017/3/7改訂

初回90分	生食 100mL
2回目60分	アバスチン 7.5mg/kg
3回目以降30分	

day1夕よりCap 2000mg/m²/day/分2を開

UFT/LV±Bev 大腸癌
(1クール4週間)

2020年3月

Day1,Day15にBev投与

初回90分	生食 100mL	
2回目60分	アバステン	5mg/kg
3回目以降30分		

day1夕よりUFT/LV 分3を開始
3週内服1週休業

Lonsurf±Bev 大腸癌
(1クール2週間)

2019年8月

Day1,Day15にBev投与

初回90分	生食 100mL
2回目 60分	アバスチン 5mg/kg
3回目以降30分	

day1夕よりLonsurf 分2を開始
5日間内服、9日間休業