

wPTX
(1クール7週間)

食道癌

2020/2 改訂

前投薬30分	生食 100mL デキサート (3.3mg/mL/A) 2 A ポララミン1A ガスター1A
day1,8,15,22,29,36 60分	生食 250mL PTX 100mg/m ²

分割DCF①Day1

(1クール4週間)

食道癌

2020/4 改訂

PICC挿入後ヘパリンロック

①	前投薬30分	生食 100mL デキサート (3.3mg/mL/A) 2 A アロキシ静注 (0.75mg/5mL/V) 1 V プロイメンド150mg/V
②	60分	生食 250ml ドセタキセル 30mg/m ²
③	全開で	生食 50ml
④メイン	22時間	生食 500ml 5-FU 800mg/m ²
④側管	90分	生食 500ml
⑤側管	60分	生食 500mL CDDP 80mg/m ²
⑥側管	90分	生食 500ml
⑦側管	90分	生食 500ml
⑧側管	90分	ソルデム3A 500ml
⑨側管	90分	ソルデム3A 500ml

減量基準		減量割合		
		薬剤	薬剤	薬剤
項目	基準値	5-FU	CDDP	DTX
WBC	2000以上3000未満	50%	50%	50%
NEU	1000以上1500未満	50%	50%	50%
PLT	5万以上7.5万未満	50%	50%	50%
非血液毒性	G3以上	50%	50%	50%
Cre	1.2以上1.5未満	変更なし	50%	50%
Ccr	40以上60未満	変更なし	50%	50%

分割DCF②Day2-5

食道癌

(1クール4週間)

2020/4 改訂

Day2-4 前投薬30分	生食 100mL デキサート (3.3mg/mL/A) 2 A
Day2,3,4,5 24時間	生食 500ml 5-FU 800mg/m ²
Day2,3,4,5 90分	生食 500ml
Day2,3,4,5 90分	生食 500ml

減量基準		減量割合		
		薬剤	薬剤	薬剤
項目	基準値	5-FU	CDDP	DTX
WBC	2000以上3000未満	50%	50%	50%
NEU	1000以上1500未満	50%	50%	50%
PLT	5万以上7.5万未満	50%	50%	50%
非血液毒性	G3以上	50%	50%	50%
Cre	1.2以上1.5未満	変更なし	50%	50%
Ccr	40以上60未満	変更なし	50%	50%

分割DCF③Day15 食道癌 (1クール4週間)

2020/4 改訂

前投薬30分	生食 100mL デキサート (3.3mg/mL/A) 2 A アロキシ静注(0.75mg/5mL/V) 1 V
60分かけて day15	生食250ml ドセタキセル 30mg/m ²

減量基準		減量割合		
		薬剤	薬剤	薬剤
項目	基準値	5-FU	CDDP	DTX
WBC	2000以上3000未満	50%	50%	50%
NEU	1000以上1500未満	50%	50%	50%
PLT	5万以上7.5万未満	50%	50%	50%
非血液毒性	G3以上	50%	50%	50%
Cre	1.2以上1.5未満	変更なし	50%	50%
Ccr	40以上60未満	変更なし	50%	50%

オブジーボ

(1クール2週間)

食道

2020/4 改訂

前投薬	なし
30分以上かけて	生食 100mL オブジーボ 240mg