

がん腫	レジメン名	リンク
食道癌	wPTX 療法(1クール7週間)	シート 1
食道癌	分割 DCF 療法①day1(1クール4週間)	シート 2
食道癌	分割 DCF 療法②day 2 - 5 (1クール4週間)	シート 3
食道癌	分割 DCF③療法 day15(1クール4週間)	シート 4
食道癌	オブジーボ療法(1クール2週間)	シート 5
食道癌	キイトルーダ療法(1クール3週間)	シート 6
食道癌	キイトルーダ+FP療法 day0-1(1クール3週間)	シート 7
食道癌	キイトルーダ+FP療法 day2-5(1クール3週間)	シート 8

wPTX
(1クール7週間)

食道癌

2020/2 改訂

前投薬30分	生食 100mL デキサート (3.3mg/mL/A) 2 A ポラミン1A ガスター1A
day1,8,15,22,29,36 60分	生食 250mL PTX 100mg/m ²

分割DCF①Day1 食道癌 (1クール4週間)

2023/4 改訂

PICC挿入後ヘパリンロック

①	前投薬30分	生食 100mL デキサート (3.3mg/mL/A) 2 A アロキシ静注(0.75mg/5mL/V) 1 V プロイメンド150mg/V
②	60分	生食 250ml ドセタキセル 30mg/m ²
③	全開で	生食 50ml
④メイン	22時間	生食 500ml 5-FU 800mg/m ²
④側管	90分	生食 500ml
⑤側管	90分	生食 500mL CDDP 80mg/m ²
⑥側管	90分	生食 500ml
⑦側管	90分	生食 500ml
⑧側管	90分	ソルデム3A 500ml
⑨側管	90分	ソルデム3A 500ml

減量基準		減量割合		
		薬剤	薬剤	薬剤
項目	基準値	5-FU	CDDP	DTX
WBC	2000以上3000未満	50%	50%	50%
NEU	1000以上1500未満	50%	50%	50%
PLT	5万以上7.5万未満	50%	50%	50%
非血液毒性	G3以上	50%	50%	50%
Cre	1.2以上1.5未満	変更なし	50%	50%
Cor	40以上60未満	変更なし	50%	50%

分割DCF②Day2-5 食道癌
(1クール4週間)

2020/4 改訂

Day2-4 前投薬30分	生食 100mL デキサート (3.3mg/mL/A) 2 A
Day2,3,4,5 24時間	生食 500ml 5-FU 800mg/m ²
Day2,3,4,5 90分	生食 500ml
Day2,3,4,5 90分	生食 500ml

減量基準		減量割合		
		薬剤	薬剤	薬剤
項目	基準値	5-FU	CDDP	DTX
WBC	2000以上3000未満	50%	50%	50%
NEU	1000以上1500未満	50%	50%	50%
PLT	5万以上7.5万未満	50%	50%	50%
非血液毒性	G3以上	50%	50%	50%
Cre	1.2以上1.5未満	変更なし	50%	50%
Cor	40以上80未満	変更なし	50%	50%

分割DCF③Day15 食道癌
(1クール4週間)

2020/4 改訂

前投薬30分	生食 100mL デキサート (3.3mg/mL/A) 2 A アロキシ静注(0.75mg/5mL/V) 1 V
60分かけて day15	生食250ml ドセタキセル 30mg/m ²

減量基準		減量割合		
		薬剤	薬剤	薬剤
項目	基準値	5-FU	CDDP	DTX
WBC	2000以上3000未満	50%	50%	50%
NEU	1000以上1500未満	50%	50%	50%
PLT	5万以上7.5万未満	50%	50%	50%
非血液毒性	G3以上	50%	50%	50%
Cre	1.2以上1.5未満	変更なし	50%	50%
Ccr	40以上60未満	変更なし	50%	50%

オブジーボ
(1クール2週間)

食道

2020/4 改訂

前投薬	なし
30分以上かけて	生食 100mL オブジーボ 240mg

キイトルーダ 食道
(1クール3週間)

2022/4 改訂

前投薬	なし
30分以上かけて	生食 100mL キイトルーダ 200mg

キイトルーダ+FP Day0-1 食道癌
(1クール3週間)

2022/2 改訂

①メイン	day0	40ml/hで	ソルラクト500ml*2
①メイン	day1	30分で	生食 100ml キイトルーダ 200mg
②メイン	day1	全開で	生食 50ml
③メイン	day1	前投薬30分	デキサート (3.3mg/mL/A) 3 A パロノセロトンバッグ (0.75mg/50mL) ホスアプレピタント点滴静注用(150mg/V)
④メイン	day1	全開で	生食 50ml
⑤メイン	day1	24時間	生食 500ml 5-FU 800mg/m ²
⑥側管	day1	90分	生食 500ml 硫酸マグネシウム(1mEq/ml 20ml) 1A
⑦側管	day1	60分	生食 250mL CDDP 80mg/m ²
⑧側管	day1	90分	生食 500ml
⑨側管	day1	30分	マンニトールS 300ml
⑩側管	day1	90分	ソルデム3A 500ml
⑪側管	day1	90分	ソルデム3A 500ml

減量パターン	シスプラチン	5-FU
1段階減量	60mg/m ²	600mg/m ²
2段階減量	40mg/m ²	400mg/m ²

キイトルーダ[®]+FP Day2-5 食道癌
(1クール3週間)

2022/2 改訂

①メイン	Day2-5	前投薬30分	生食 100mL デキサート (3.3mg/mL/A) 2 A
②メイン	Day2,3,4,5	24時間	生食 500ml 5-FU 800mg/m ²
③側管	Day2,3,4,5	90分	生食 500ml
④側管	Day2,3,4,5	90分	生食 500ml