

# XELOX

(1クール3週間)

胃癌

2020/4 改訂

前投薬30分	生食 100mL デキサート (3.3mg/mL/A) 2 A アロキシ静注(0.75mg/5mL/V) 1 V
初回90分 2回目60分 3回目以降30分	生食 100mL アバスチン 7.5mg/kg
2時間	5%Tz 500mL エルプラット 100mg/m <sup>2</sup>

day1夕よりCap 2000mg/m<sup>2</sup>/day/分2を開

## 減量パターン

	エルプラット	Cap
1段階	75	1500
2段階	50	1000

末梢神経障害のみの場合はエルプラットのみ減量でも可

nabPTX±Rmab 胃癌  
(1クール4週間)

2019/2 改訂

前投薬30分	生食 100mL ポララミン 1A デキサート (3.3mg/mL/A) 2 A
60分かけて day1, 15	生食 250mL サイラムザ 8mg/kg
30分かけて day1, 8, 15	生食50ml nabPTX 100mg/m <sup>2</sup>

※サイラムザの生食は全量250mlになるように調整  
減量パターン

infusion reaction   サイラムザ  
G1or2→50%減速  
G3以上 中止

血球減少           PTX  
1段階               80  
2段階               60

たんぱく尿         サイラムザ  
1段階               6  
2段階               5

PTX±Rmab  
(1クール4週間)

胃癌

2017/5 改訂

前投薬30分	生食 100mL デキサート (3.3mg/mL/A) 2 A ポララミン 1A ガスター 1A
60分 day1, 15	生食 250mL サイラムザ 8mg/kg
90分かけて day1, 8, 15	生食250ml PTX 80mg/m <sup>2</sup>

※サイラムザの生食は全量250mlになるように調整

減量パターン

infusion reaction    サイラムザ  
G1or2→50%減速  
G3以上 中止

血球減少            PTX  
1段階                70  
2段階                60

たんぱく尿           サイラムザ  
1段階                6  
2段階                5

# wCPT-11

(1クール4週間)

胃癌

2016/5 改訂

前投薬30分	生食 100mL デキサート (3.3mg/mL/A) 2 A アロキシ静注(0.75mg/5mL/V) 1 V
90分 day1, 8, 15	5%Tz 250mL CPT-11 100mg/m <sup>2</sup>

## 減量パターン

1段階	80mg/m <sup>2</sup>
2段階	60mg/m <sup>2</sup>

# biwCPT-11

(1クール2週間)

胃癌

2016/5 改訂

前投薬30分	生食 100mL デキサート (3.3mg/mL/A) 2 A アロキシ静注(0.75mg/5mL/V) 1 V
90分 day1, 15	5%Tz 250mL CPT-11 150mg/m <sup>2</sup>

## 減量パターン

1段階 120mg/m<sup>2</sup>

2段階 100mg/m<sup>2</sup>

# オブジーボ

(1クール2週間)

胃癌

2019/5 改訂

前投薬	なし
30分以上かけて	生食 100mL オブジーボ 240mg

# TS-1+DTX

(1クール3週間)

補助化学療法

胃癌

2019/5 改訂

前投薬30分	生食 100mL デキサート (3.3mg/mL/A) 2 A
90分かけて day1	生食250ml ドセタキセル 40mg/m <sup>2</sup>

		day1よりday14までS-1内服	
	DTX	体表面積	S-1
1段階	35	1.25未満	80mg/day/分2
2段階	30	1.25～1.5未満	100mg/day/分2
		1.5以上	120mg/day/分2

1サイクル目はTS-1単剤投与

2-7サイクルはDTX併用

8サイクル以降はTS-1単剤(6週間毎)で合計1年間になるまで継続投与。

# TS-1+PTX

(1クール3週間)

胃癌

2019/5 改訂

前投薬30分	生食 100mL デキサート (3.3mg/mL/A) 2 A ポララミン 1A ガスター 1A
90分かけて day1, 8	生食250ml PTX 50mg/m <sup>2</sup>

	PTX
1段階	40
2段階	30

day1よりday14までS-1内服

体表面積	S-1
1.25未満	80mg/day/分2
1.25～1.5未満	100mg/day/分2
1.5以上	120mg/day/分2



# S-1+CDDP

(1クール5週間)

胃癌

2018/3 改訂

day7	16時～翌10時	ソルデム3A 500ml 3本持続
day8	10時～13時	ソルデム3A 500ml
day8	前投薬30分	生食 100mL デキサート (3.3mg/mL/A) 2 A アロキシ静注(0.75mg/5mL/V) 1 V プロイメンド <sup>®</sup> 150mg/V
day8	2時間	生食 500mL CDDP 60mg/m <sup>2</sup>
day8	30分	マンニトールS 300ml
day8	16時～翌10時	ソルデム3A 500ml 4本持続
day9	10時～翌10時	ソルデム3A 500ml 4本持続

## CDDP

1段階 50mg/m<sup>2</sup>

2段階 30mg/m<sup>2</sup>

※CDDPの生食は全量500mlになるように調整

day1よりday21までS-1内服

体表面積 S-1

1.25未満 80mg/day/分2

1.25～1.5未満 100mg/day/分2

1.5以上 120mg/day/分2

腎障害発現時

Ccr CDDP

60以上 50mg/m<sup>2</sup>

30～60 30mg/m<sup>2</sup>

30以下 中止

# XP±HER

(1クール3週間)

胃癌

2020/4 改訂

day0	16時～翌10時	ソルデム3A 500ml 3本持続
day1	10時～12時	ソルデム3A 500ml
day1	前投薬30分	生食 100mL デキサート (3.3mg/mL/A) 2 A プロイメンド(150mg/V) 1V アロキシ静注(0.75mg/5mL/V) 1 V
day1	2時間	生食 500mL CDDP 80mg/m <sup>2</sup>
	初回90分 2回目以降30分	生食 250mL ハーセプチン 初回 8mg/kg 2回目～ 6mg/kg
day1	14時～翌10時	ソルデム3A 500ml 4本持続
day2	10時～翌10時	ソルデム3A 500ml 4本持続

## day1夕よりday15朝までCap内服

体表面積	Cap
1.36未満	2400mg/day/分2
1.36～1.66未満	3000mg/day/分2
1.66～1.96未満	3600mg/day/分2
1.96以上	4200mg/day/分2

## 減量パターン

	Cap	CDDP
1段階	1段階 * 参照	60mg/m <sup>2</sup>
2段階	2段階 * 参照	40mg/m <sup>2</sup>
腎障害発現時		
Ccr		CDDP
60以上		80mg/m <sup>2</sup>
51～59		60mg/m <sup>2</sup>
41～50		40mg/m <sup>2</sup>
40以下		中止
30以下		中止

# SP±HER

(1クール3週間)

胃癌

2020/4 改訂

day0	16時～翌10時	ソルデム3A 500ml 3本持続
day1	10時～12時	ソルデム3A 500ml
day1	前投薬30分	生食 100mL デキサート (3.3mg/mL/A) 2A プロイメンド(150mg/V) 1V アロキシ静注(0.75mg/5mL/V) 1V
day1	2時間	生食 500mL CDDP 60mg/m <sup>2</sup>
	初回90分 2回目以降30分	生食 250mL ハーセプチン 初回 8mg/kg 2回目～ 6mg/kg
day1	14時～翌10時	ソルデム3A 500ml 4本持続
day2	10時～翌10時	ソルデム3A 500ml 4本持続

## day1夕よりday15朝までTS-1内服

体表面積	TS-1投与量
1.25m <sup>2</sup> 未満	80mg/day/分2
1.25m <sup>2</sup> 以上,1.5m <sup>2</sup> 未満	100mg/day/分2
1.5m <sup>2</sup> 以上	120mg/day/分2

## 減量パターン

	TS-1	CDDP
1段階	1段階減量	50mg/m <sup>2</sup>
2段階	2段階減量	30mg/m <sup>2</sup>

## 腎障害発現時

Ccr	CDDP
60以上	80mg/m <sup>2</sup>
51～59	60mg/m <sup>2</sup>
41～50	40mg/m <sup>2</sup>
40以下	中止
30以下	

# SOX±HER (1クール3週間)

胃癌

2020/4 改訂

前投薬30分	生食 100mL デキサート (3.3mg/mL/A) 2 A アロキシ静注(0.75mg/5mL/V) 1 V
初回90分 2回目以降30分	生食 250mL 初回 8mg/kg ハーセプチン 2回目～ 6mg/kg
2時間	エルプラット 100mg/m <sup>2</sup>

## day1夕よりday15朝までS-1内服

体表面積	S-1
1.25未満	80mg/day/分2
1.25～1.5未満	100mg/day/分2
1.5以上	120mg/day/分2

末梢神経障害のみの場合はエルプラットのみ減量でも可

## 減量パターン

	エルプラット
1段階	75
2段階	50

# CPT-11+HER

胃癌

(1クール3週間)

2020/4 改訂

前投薬30分	生食 100mL デキサート (3.3mg/mL/A) 2 A アロキシ静注(0.75mg/5mL/V) 1 V
初回90分 2回目以降30分 Day1	生食 250mL ハーセプチン 初回 8mg/kg 2回目～ 6mg/kg
90分 Day1,Day8	5%Tz 250mL CPT-11 100mg/m <sup>2</sup>

## 減量基準

1段階 80mg/m<sup>2</sup>

2段階 60mg/m<sup>2</sup>

# PTX±HER

(1クール4週間)

胃癌

2020/4 改訂

前投薬30分	生食 100mL デキサート (3.3mg/mL/A) 2 A ポラミン 1A ガスター 1A
初回90分 2回目以降30分 Day1	生食 250mL ハーセプチン 初回 8mg/kg 2回目～ 6mg/kg
90分かけて day1, 8, 15	生食250ml PTX 80mg/m <sup>2</sup>

減量基準	PTX
1段階	70
2段階	60

biweekly CPT-11+CDDP 胃癌  
(1クール2週間)

2020/10 改訂

60分	ソルデム1 500ml
前投薬30分	生食 100mL デキサート (3.3mg/mL/A) 2 A アロキシ静注(0.75mg/5mL/V) 1 V プロイメンド150mg/V
90分	5%Tz 250ml CPT-11 60mg/m <sup>2</sup>
ゆっくりと	生食20ml ラシックス20mg 1A
90分	生食 500mL CDDP 30mg/m <sup>2</sup>
60分	ソルラクト 500ml

外来は診察前にソルデム1 500ml 投与開始。

中止

# SOX

(1クール3週間)

胃癌

2017/5 改訂

前投薬30分	生食 100mL デキサート (3.3mg/mL/A) 2 A アロキシ静注(0.75mg/5mL/V) 1 V
2時間	5%Tz 500mL エルプラット 100mg/m <sup>2</sup>

## 減量パターン

	エルプラット	day1夕よりday15朝までS-1内服
		体表面積 S-1
1段階	75	1.25未満 80mg/day/分2
2段階	50	1.25~1.5未満 100mg/day/分2
		1.5以上 120mg/day/分2

末梢神経障害のみの場合はエルプラットのみ減量でも可